

# Приближение функций и смежные вопросы



Непрерывная функция не всегда может быть хорошо приближена интерполяционным многочленом Лагранжа. В частности, последовательность интерполяционных многочленов Лагранжа по равноотстоящим узлам не обязательно сходится к функции даже в том случае, если функция бесконечно дифференцируема. В тех случаях, когда сходимость имеет место, часто получение достаточно хорошего приближения требует использования полиномов высокой степени. В то же время, если для приближаемой функции удастся подобрать подходящие узлы интерполяции, то степень интерполяционного многочлена, приближающего функцию с заданной точностью, может быть значительно снижена.

В ряде конкретных случаев целесообразно приближать функцию не путем интерполяции, а путем построения так называемого *наилучшего приближения*. Проблемы, связанные с построением наилучшего приближения, и будут рассмотрены в настоящей главе.

## § 1. Наилучшие приближения в линейном нормированном пространстве

Сформулируем задачу построения наилучшего приближения на абстрактном языке. Пусть имеется элемент  $f$  линейного нормированного пространства  $R$ . Требуется найти его наилучшее приближение линейной комбинацией

$\sum_{j=1}^n c_j g_j$  данных линейно независимых элементов  $g_1, \dots, g_n \in R$ .

Это означает: найти элемент  $\sum_{j=1}^n c_j^0 g_j$  такой, что

$$\left\| f - \sum_{j=1}^n c_j^0 g_j \right\| = \Delta = \inf_{c_1, \dots, c_n} \left\| f - \sum_{j=1}^n c_j g_j \right\|.$$

По-другому это можно обозначить следующим образом:

$$\sum_{j=1}^n c_j^0 g_j = \arg \inf_{c_1, \dots, c_n} \left\| f - \sum_{j=1}^n c_j g_j \right\|.$$

Если такой элемент существует, то он называется *элементом наилучшего приближения*.

**Теорема.** *Элемент наилучшего приближения существует.*

*Доказательство.* Вследствие соотношений (следствие из неравенства треугольника)

$$\left| \left\| f - \sum_{j=1}^n c_j^1 g_j \right\| - \left\| f - \sum_{j=1}^n c_j^2 g_j \right\| \right| \leq \left\| \sum_{j=1}^n (c_j^1 - c_j^2) g_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n |c_j^1 - c_j^2| \|g_j\|$$

функция

$$F_f(c_1, \dots, c_n) = \left\| f - \sum_{j=1}^n c_j g_j \right\|$$

является непрерывной функцией аргументов  $c_j$  при любом  $f \in R$ . Пусть  $|\mathbf{c}|$  — евклидова норма вектора  $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$ . Функция  $F_0(c_1, \dots, c_n) = \|c_1 g_1 + \dots + c_n g_n\|$  непрерывна на единичной сфере  $|\mathbf{c}| = 1$  и, следовательно, в некоторой ее точке  $(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_n)$  достигает своей нижней грани  $\tilde{F}$  по сфере, причем  $\tilde{F} \neq 0$ , так как равенство  $\tilde{F} = \|\tilde{c}_1 g_1 + \dots + \tilde{c}_n g_n\| = 0$  противоречит линейной независимости элементов  $g_1, \dots, g_n$ . Для любого  $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n) \neq (0, \dots, 0)$  справедлива оценка

$$\|c_1 g_1 + \dots + c_n g_n\| = F_0(c_1, \dots, c_n) = |\mathbf{c}| F_0 \left( \frac{c_1}{|\mathbf{c}|}, \dots, \frac{c_n}{|\mathbf{c}|} \right) \geq \|\mathbf{c}\| \tilde{F}.$$

Пусть  $\gamma > 2\|f\|/\tilde{F}$ . Функция  $F_f(c_1, \dots, c_n)$  непрерывна в шаре  $|\mathbf{c}| \leq \gamma$ ; следовательно, в некоторой точке шара  $(c_1^0, \dots, c_n^0)$  она достигает своей нижней грани  $F^0$  по шару. Имеем  $F^0 \leq F_f(0, \dots, 0) = \|f\|$ . Вне этого шара выполняются соотношения

$$\begin{aligned} F_f(c_1, \dots, c_n) &\geq \|c_1 g_1 + \dots + c_n g_n\| - \|f\| > \\ &> \left( 2\|f\| / \|\tilde{F}\| \right) \|\tilde{F}\| - \|f\| = \|f\| > F^0. \end{aligned}$$

Таким образом, вне этого шара

$$F_f(c_1, \dots, c_n) \geq F^0 = F_f(c_1^0, \dots, c_n^0)$$

при всех возможных  $c_1, \dots, c_n$ . Теорема доказана.

Элементов наилучшего приближения, вообще говоря, может быть несколько.

Пространство  $R$  называется *строго нормированным*, если из условия

$$\|f + g\| = \|f\| + \|g\|, \quad \|f\|, \|g\| \neq 0$$

следует  $f = \alpha g$ ,  $\alpha > 0$ .

**Задача 1.** Доказать, что в случае строго нормированного пространства  $R$  элемент наилучшего приближения единствен.

**Задача 2.** Доказать, что пространство  $L_p((0, 1), q(x))$ ,  $q(x) \geq 0$  почти всюду, с нормой

$$\|f\|_p = \sqrt[p]{\int_0^1 |f(x)|^p q(x) dx}$$

строго нормированное при  $1 < p < \infty$ .

Рассмотреть отдельно простейший случай гильбертова пространства  $p = 2$ .

## § 2. Наилучшее приближение

### в гильбертовом пространстве и вопросы,

### возникающие при его практическом построении

Для гильбертова пространства элемент наилучшего приближения единствен (см. задачу 1.2) и проблема его нахождения формально сводится к решению системы линейных уравнений.

Наиболее простой способ получения этой системы следующий. По определению коэффициенты  $a_j$  элемента наилучшего приближения реализуют минимум выражения

$$\delta^2 = \left\| f - \sum_{j=1}^n a_j g_j \right\|^2 = \left( f - \sum_{j=1}^n a_j g_j, f - \sum_{j=1}^n a_j g_j \right).$$

Приравнивая нулю производные по  $\operatorname{Re} a_i$  и  $\operatorname{Im} a_i$ , получаем искомую систему уравнений для определения  $a_i$ . Вследствие существования и единственности элемента наилучшего приближения, эта система имеет единственное решение.

Построим эту систему и исследуем вопрос о единственности ее решения несколько другим способом.

Для простоты изложения ограничимся случаем вещественных  $f$  и  $g_j$ .

Пусть  $a_j = \alpha_j + \mathbf{i}\beta_j$ ,  $\alpha_j, \beta_j$  — вещественные числа; имеем  $f - \sum_{j=1}^n a_j g_j = \left( f - \sum_{j=1}^n \alpha_j g_j \right) - \mathbf{i} \sum_{j=1}^n \beta_j g_j$ . Положим

$$\Phi(a_1, \dots, a_n) = \left\| f - \sum_{j=1}^n a_j g_j \right\|^2.$$

Если  $f_1$  и  $f_2$  вещественны, то  $\|f_1 + \mathbf{i}f_2\|^2 = (f_1 + \mathbf{i}f_2, f_1 + \mathbf{i}f_2) = (f_1, f_1) + \mathbf{i}(f_2, f_1) - \mathbf{i}(f_1, f_2) + (f_2, f_2) = \|f_1\|^2 + \|f_2\|^2$ , поэтому

$$\left\| f - \sum_{j=1}^n a_j g_j \right\|^2 = \left\| f - \sum_{j=1}^n \alpha_j g_j \right\|^2 + \left\| \sum_{j=1}^n \beta_j g_j \right\|^2. \quad (1)$$